

Rapport sur la noyade au Canada

Édition de 2017

Élaboré par le Centre canadien de recherche sur
la prévention de la noyade pour la Société de sauvetage




SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Les experts en surveillance aquatique

La tendance à la baisse à long terme des décès par noyade au Canada se maintient.

Variation du nombre de décès non-intentionnels liés à l'eau et du taux de mortalité au Canada sur une période de 25 ans, soit de 1990 à 2014




Selon les plus récentes données disponibles en provenance des bureaux de coroners en chef et des médecins légistes, 428 Canadiennes et Canadiens se sont noyés dans des plans d'eau au Canada en 2014. Ce qui constitue le nombre le moins élevé de décès liés à l'eau rapportés au cours des derniers 25 ans.

Cette diminution est en partie attribuable à un nombre réduit de noyades dans les provinces les plus densément peuplées soit l'Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique. Les données recueillies en 2014 en provenance du bureau du coroner en chef de l'Ontario indiquent un total de 130 décès liés à l'eau

au cours de cette année, ce qui représente 30 noyades de moins qu'au cours de toute autre année et ce depuis une décennie. Le Québec a rapporté 77 noyades, en comparaison avec une moyenne annuelle de 83 et en Colombie-Britannique il y a eu 66 décès par noyade en comparaison avec une moyenne annuelle de 75.

En moyenne 464 personnes se sont noyées au Canada à chaque année au cours de la plus récente période de cinq ans (de 2010 à 2014), ce qui représente une diminution par rapport à la moyenne de 489 par année entre 2005 et 2009. La moyenne des décès par noyade a

diminué au cours des derniers 25 ans de 2,3 par 100 000 habitants annuellement au début des années 1990 (de 1990 à 1994) à 1,3 par 100 000 habitants selon les dernières données (de 2010 à 2014). Malgré un tel progrès à long terme, un nombre encore trop élevé de décès évitables liés à l'eau continue de se produire au Canada : un total de 2 322 enfants, adolescents et adultes ont perdu la vie dans les eaux canadiennes entre 2010 et 2014.



Nombre de décès non-intentionnels reliés à l'eau à travers le Canada en 2015 et 2016

Décès non-intentionnels reliés à l'eau par province et territoire en 2015 et 2016

Les données provisoires et préliminaires concernant les décès par noyade recensées après 2014 proviennent de rapports parus dans les médias et sur Internet. Tel qu'indiqué dans le tableau à droite au moins 311 noyades ont été signalées en 2015 et au moins 297 autres se sont produites en 2016.

Province / Territoire	2015	2016
Alberta	15	14
Colombie-Britannique	67	56
Manitoba	8	14
Nouveau-Brunswick	7	10
Terre-Neuve-et-Labrador	18	10
Nouvelle-Écosse	18	7
Territoires du Nord-Ouest	2	0
Nunavut	5	1
Ontario	92	117
Île-du-Prince-Édouard	0	1
Québec	63	57
Saskatchewan	14	9
Yukon	2	1
Total	311	297

Quelles sont les personnes qui se noient?


Groupe d'âge

L'âge moyen des victimes de la noyade augmente en corrélation avec le vieillissement de la population canadienne.

Au cours de la période entre 2010 et 2014, la moyenne d'âge de victimes de la noyade se situait à 44 ans par rapport à 41 ans durant la période des cinq années antécédentes. En examinant le taux de décès reliés au domaine aquatique par rapport à la population au Canada, les groupes d'âge les plus à risque de

se noyer sont demeurés constants au cours des derniers dix ans. Le plus haut taux de mortalité entre 2010 et 2014 a été encore une fois enregistré parmi les jeunes de 20 à 34 ans, les baby-boomers de 50 à 64 ans et les aînés de 65 ans et plus (1,5, 1,5 et 1,9 par 100 000 habitants respectivement). Au sein de ces groupes d'âge, le plus grand nombre de décès par noyade ont été déplorés parmi les jeunes âgés de 20 à 24 ans, les personnes âgées entre 55 à 59 ans et celles âgées entre 85 à 89 ans (1,8, 1,6 et 2,4 par 100 000 habitants respectivement). En outre, les jeunes âgés entre 20 et 24 ans ont atteint le taux le plus élevé de noyades de tous les groupes d'âge avec une moyenne de 43 noyades à chaque année.

Le taux le plus bas de noyade a été recensé parmi les jeunes enfants. Le taux le moins élevé de décès reliés à l'eau parmi tous les groupes d'âge se retrouve chez les jeunes âgés entre 5 et 14 ans (0,4 par 100 000 habitants). La tendance à long terme en ce qui a trait à la baisse des taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans au Canada s'est poursuivie entre 2010 et 2014 (1,1 par 100 000 habitants avec une diminution de 8 % par rapport à 1,2 par 100 000 habitants entre 2005 et 2009).



Sexe

La majorité des victimes de la noyade au Canada se retrouve parmi les hommes.

Concordant avec les années précédentes, environ 8 sur 10 de ces victimes sont de sexe masculin. Parmi les 464 décès reliés à l'eau qui se sont produits à chaque année entre 2010 et 2014, un total de 376 des victimes étaient des hommes. Ce qui se traduit par un taux de décès liés à l'eau de 2,2 par 100 000 habitants. En comparaison avec à une moyenne de 89 victimes de la noyade de sexe féminin soit 0,5 par 100 000 habitants.

Cette proportion d'hommes victimes d'une noyade varie toutefois par secteur et par groupe d'âge. Quoique cette propension vers un plus grand nombre de noyades parmi les hommes fût évidente partout au Canada, elle était plus prononcée particulièrement sur la côte atlantique du Canada. À Terre-Neuve-et-Labrador et dans les Maritimes, 9 de 10 victimes de la noyade étaient de sexe masculin. La prépondérance des victimes de sexe masculin est manifeste à travers tous les groupes d'âge, en particulier chez les jeunes adultes de 20 à 34 ans. La proportion la moins élevée de décès a été recensée parmi les enfants de moins de 5 ans et chez les aînés.

Il y a eu moins de décès par noyade parmi les femmes en 2014 que lors des plus récentes années. Après une hausse modérée du nombre et pourcentage de femmes victimes de décès reliés au domaine aquatique à chaque année entre 2010 et 2013, atteignant un sommet de 100 femmes s'étant noyées en 2013 (soit 23 %), le pourcentage de victimes de sexe féminin en 2014 a diminué de 20 % pour un total de 84 décès.

Origine ethnique

Les risques de se noyer varient selon l'origine ethnique de la personne.

Les autochtones continuent d'être le plus à risque de se noyer que les résidents canadiens qui ne sont pas autochtones. Entre 2010 et 2014, une moyenne de 50 victimes de la noyade par année (soit 12 % de toutes les victimes d'une noyade) étaient d'origine autochtone – une proportion beaucoup plus élevée que les quelques 4 % de la population canadienne s'identifiant comme étant d'origine autochtone.

Le Centre canadien de recherche sur la prévention de la noyade continue à explorer les risques de noyade des nouveaux arrivants au Canada. Dans le cadre de ces efforts, en 2010 le Centre a entrepris de recueillir des données portant sur le pays d'origine des victimes de la noyade ainsi que le nombre d'années s'étant écoulé depuis leur arrivée au Canada avant leur noyade. Mais il appert malheureusement qu'il est encore compliqué d'obtenir ce genre d'information; car pour 60 % des incidents, le pays d'origine n'a toujours pas pu être établi. Il nous faudra accroître encore plus nos efforts visant à améliorer la divulgation du pays d'origine des victimes de noyade. Pour les incidents où de telles données étaient disponibles depuis 2010, nous pouvons confirmer que 90 victimes de noyade provenaient d'un pays autre que le Canada, soit de l'Amérique du Nord, de l'Afrique, de l'Asie ou de l'Europe.



Quand les noyades se produisent-elles?

Mois de l'année

Les décès par noyade se produisent tout au long de l'année au Canada, mais le plus grand nombre se déroulent au cours des mois les plus chauds (soit de mai à septembre).

Au cours de la période entre 2010 et 2014, plus du deux tiers (67 %) des noyades se sont produites au cours d'un de ces mois de l'année soit une moyenne de 312 noyades à chaque année. La grande majorité de ces incidents a lieu au mois de juillet (19 % pour une moyenne de 89 décès annuellement). Le pourcentage de noyades au cours des mois les plus chauds était légèrement plus élevé de 2010 à 2014 qu'au cours des cinq années précédentes (64 % entre 2005 et 2009). Cet accroissement a été provoqué par plus de décès par noyade en juin (68 par année vs 65 par année), en juillet (89 par année vs 86 par année) et en septembre (42 par année vs 35 par année) et par moins de noyades lors des mois les plus froids sauf pour ce qui est de février.


Temps de l'année

Moyenne du nombre de décès par année et pourcentage de décès non-intentionnels liés à l'eau au Canada de 2005 à 2014

Jour de la semaine

Les décès reliés au domaine aquatique se produisent à tous les jours de la semaine, mais le plus grand nombre se déroulent au cours de la fin de semaine.

En accord avec la période antécédente de cinq ans, plus de la moitié (soit 54 %) des noyades entre 2010 et 2014 ont eu lieu au cours de la fin de semaine (du vendredi au dimanche) et un peu moins de la moitié (soit 46 %) pendant la semaine (du lundi au jeudi). Le plus grand nombre de tous les décès liés à l'eau se sont produits le samedi (101 par année soit 22 %) suivi du dimanche (90 par année soit 19 %).



Où les noyades ont-elles lieu?

Plans d'eau

Les noyades se produisent dans presque tous les différents plans d'eau au Canada, quoique la majorité se déroule dans des plans d'eau naturels.


Entre 2010 et 2014 par rapport aux années antécédentes, la majorité (soit 73 %) des décès reliés à l'eau se sont déroulés dans des plans d'eau naturels, tels que des lacs et des étangs (36 %), des rivières et des ruisseaux (28 %) et les océans (8 %). Ce pourcentage continue toutefois d'être beaucoup plus élevé dans les plans d'eau naturels situés dans les territoires et les provinces atlantiques par rapport aux autres provinces (se situant entre 89 % et 100 %). Au Canada, un total de 338 personnes se noie en moyenne dans des plans d'eau naturels à chaque année.

Les noyades dans des milieux non naturels sont toujours moins fréquentes, mais comptent toutefois pour une moyenne annuelle de 163 décès annuels reliés à l'eau entre 2010 et 2014. Comme lors des années précédentes, ce sont les baignoires qui constituent l'environnement non naturel où se produit le plus de noyades au Canada (soit 10 %). Le plus grand nombre de noyades dans les baignoires par province s'est encore une fois produit en Ontario (113), suivi du Québec (38), de l'Alberta (28) et de la Colombie-Britannique (25); contribuant ainsi à un pourcentage de 14 %, 9 %, 14 % et 7 % du total des noyades dans ces provinces respectivement.

En moyenne 36 noyades se sont produites dans une piscine à chaque année entre 2010 et 2014 ce qui donne un total de 8 % de tous les décès non-intentionnels. Ce qui maintient une constance avec les années antécédentes lors desquelles ces décès se sont déroulés dans des piscines résidentielles (soit 89%). Le plus grand nombre des noyades dans des piscines résidentielles se sont produites en Ontario (soit 90), suivi du Québec (39) et de la Colombie-Britannique (14) : contribuant ainsi à 11 %, 9 % et 4 % du nombre total de noyades dans chacune de ces provinces respectivement. Il est encore difficile d'obtenir des renseignements détaillés concernant la présence d'une clôture et d'une porte pour celle-ci suite à une noyade dans une piscine résidentielle. Lors des incidents où nous avons pu obtenir ces informations, 40 % des piscines ne possédait pas de clôture ou celle-ci n'était pas réglementaire et 77 % ne possédaient pas de porte, celle-ci ne fermait pas automatiquement ou le loquet n'était pas sécuritaire.

Très peu de noyades se déroulent dans les piscines supervisées par des surveillants-sauveteurs telles que les piscines publiques et les plages. Entre 2010 et 2014, elles constituent moins de 1 % de tous les décès par noyade dans un lieu supervisé par un surveillant-sauveteur.

Le plan d'eau où les gens se noient le plus souvent varie d'un groupe d'âge à l'autre. Les noyades des jeunes enfants et des adultes d'âge moyen se produisent habituellement dans des plans d'eau naturels tels que les lacs et les rivières. Les bébés de moins d'un an et les aînés de plus de 65 ans font partie du groupe qui est le plus vulnérable pour se noyer dans une baignoire. Entre 2010 et 2014, 100 % de tous les décès reliés à l'eau chez les bébés se sont produits dans une baignoire. Parmi toutes les personnes s'étant noyées dans une baignoire 40 % étaient des personnes âgées de 65 ans et plus. Les piscines résidentielles continuent d'être le lieu où les enfants âgés entre 1 an à 4 ans se noient le plus souvent (39 %).



Provinces et territoires

Les noyades se produisent dans toutes les régions du Canada, mais ce sont les Territoires, Terre-Neuve-et-Labrador et la Saskatchewan qui possèdent le plus haut taux de noyades par habitants.

Le taux moyen de décès par noyade au Nunavut (soit 13,2 par 100 000 habitants), au Yukon (10,0 par 100 000 habitants) et dans les Territoires du Nord-Ouest (7,8 par 100 000 habitants) ont continués d'être substantiellement plus élevé que partout

ailleurs au Canada entre 2010 et 2014. Après les Territoires, le taux le plus élevé se situe à Terre-Neuve-et-Labrador (avec 3,5 par 100 000 habitants) suivi de Saskatchewan (avec 2,4 par 100 000 habitants).

Les décès reliés au domaine aquatique ont connu une baisse dans la majorité des provinces et territoires entre 2010 et 2014, correspondant ainsi à une diminution globale du taux national de noyade par rapport à la période antécédente de cinq ans. La plus grande diminution s'est produite dans les Territoires et les Provinces Maritimes. Entre 2010 et 2014, le taux de noyade dans les Territoires a continué à descendre et est passé de 44 % soit 13,9 par 100 000 habitants de 2005 à 2009 à 7,8 par 100 000 habitants de 2010 à 2014. Une légère réduction a aussi été signalée au Yukon (de -14 % soit 11,6 à 10,0) et au Nunavut de (-13 % soit 15,3 à 13,2). Tant à Terre-Neuve-et-Labrador qu'en Nouvelle-Écosse le taux de noyade a diminué de 24 %

(de 4,6 par à 3,5 par 100 000 habitants à Terre-Neuve-et-Labrador et de 2,0 à 1,5 par 100 000 habitants en Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick a rapporté une diminution de 14 % (de 1,7 à 1,4 par 100 000 habitants).

Les autres provinces ayant connu une baisse un peu plus modérée de leur taux de décès reliés à l'eau furent la Colombie-Britannique (- 12 %), l'Ontario (- 11 %), l'Alberta (- 9 %) et le Québec (- 5 %). La Saskatchewan est la seule province qui ait connu une augmentation de son taux de noyades au cours de la période de 2010 à 2014 (+ 35 % soit de 1,7 par 100 000 habitants de 2005 à 2009 à 2,4 par 100 000 habitants de 2010 à 2014).


Milieus urbains versus milieux ruraux

Un nombre disproportionné de gens se noie en milieu rural par rapport au pourcentage de la population qui vit dans un tel milieu.

Moins de 20 % de la population canadienne vit en milieu rural, toutefois 39 % de toutes les noyades s'y sont produites entre 2010 et 2014. Concordant avec les résultats des années antécédentes, les régions du Canada comptant la plus grande proportion de noyade en milieu rural étaient la Saskatchewan (80 %), le Manitoba (68 %) et les Territoires (71 %). À des fins de comparaison, le pourcentage de la population rurale de la Saskatchewan est d'environ 33 %, au Manitoba d'environ 28 % et dans les Territoires en moyenne 46 %.

Au Canada, entre 2010 et 2014 près de la moitié des 913 victimes de la noyade en milieu rural c.à.d. 396 (soit 43 %) résidaient de manière permanente en milieu urbain.


Par provinces et territoires
Moyenne du nombre de décès non-intentionnels reliés à l'eau par année et taux de décès au Canada de 2005 à 2014



À quels types d'activités les victimes s'adonnaient-elles?

But de l'activité

Moyenne du nombre de décès par année et pourcentage de décès non-intentionnels reliés à l'eau au Canada de 2005 à 2014



But de l'activité

La majorité des décès par noyade au Canada se produit au cours d'activités récréatives.

Entre 2010 et 2014, un moyenne de 282 personnes se sont noyées alors qu'elles participaient à des activités de loisir dans l'eau, sur l'eau ou près de l'eau; totalisant 61 % de tous les décès non intentionnels reliés à l'eau. Comme par les années passées, l'activité récréative la plus couramment pratiquée parmi les victimes de ces noyades sont survenues lors de la pratique de la natation (28 %) et de marcher, courir ou jouer près de l'eau ou sur la glace (15 %). Une moyenne de 121 personnes se noie à chaque année alors qu'elles participent à une de ces deux activités. Les bateaux à moteur (10 %) et la pêche à bord d'une embarcation (9 %) font également partie d'une des deux autres activités récréatives les plus communes auxquelles les victimes participaient lorsqu'elles se sont noyées. En moyenne 55 personnes perdent la vie à chaque année alors qu'elles s'adonnaient à une de ces deux activités.

La deuxième activité la plus populaire au Canada était celle de la vie quotidienne qui a recensé la plus haute proportion d'incidents de noyade (soit 27 %). Au Canada entre 2010 et 2014, une moyenne de 123 personnes vaquait


à une « activité de la vie quotidienne » juste avant de se noyer. La majorité de ces victimes étaient en train de prendre un bain (35 %) ou ont été impliquées dans un accident de voiture (31 %) lors d'un déplacement. Une moyenne de 81 personnes se sont noyées annuellement alors qu'elles étaient impliquées dans une de ces deux activités routinières.

Les activités récréatives et de la vie quotidienne font partie de la majorité (87 %) des décès non-intentionnels reliés au domaine aquatique. Peu de noyades surviennent pendant une activité professionnelle (4 %) et le pourcentage de noyades dans cette catégorie a légèrement diminué par rapport aux cinq années précédentes pour une moyenne annuelle de 28 (soit 6 %) de 2005 à 2009 pour atteindre une moyenne de 21 par année (soit 4 %) entre 2010 et 2014. Une plus grande proportion de décès par noyade reliée à leur occupation se produit dans les provinces atlantiques : 20 % en Nouvelle-Écosse, 18 % à Terre-Neuve-et-Labrador et 17 % au Nouveau-Brunswick. Comme par les années passées, le secteur d'activité professionnelle le plus vulnérable continue d'être la pêche commerciale (45 %) et malgré que le nombre de noyade au sein des activités professionnelles ait globalement diminué, le nombre de ceux reliés à la pêche commerciale a légèrement augmenté (soit +7 %) durant la dernière période de cinq ans.

Avec une moyenne annuelle de 30 victimes de la noyade (soit 6 %) l'activité pratiquée juste avant leur noyade est inconnue, ce qui indique que plusieurs de ces victimes pratiquaient des activités aquatiques alors qu'elles étaient seules ou que personne ne peut témoigner de l'activité pratiquée par les victimes de noyade avant l'incident en question.

Les principales activités récréatives

Moyenne du nombre de décès par année et pourcentage de décès non-intentionnels reliés à l'eau au Canada de 2010 à 2014




Type d'activité

Les décès liés à l'eau se déroulent le plus souvent lors d'activités aquatiques et de plaisance.

Une moyenne de 123 personnes par année (soit 26 %) se noient alors qu'elles pratiquaient une activité aquatique (c'est-à-dire que la victime avait l'intention d'être dans l'eau, mais quelque chose de catastrophique s'est produit qui a fait que cela a mal tourné) et une moyenne de 119 personnes s'est noyées (soit 26 %) à chaque année en pratiquant une quelconque activité de plaisance.

Incidents en navigation de plaisance par genre d'embarcation

Moyenne du nombre de décès par année et pourcentage de décès liés à la navigation de plaisance au Canada de 2005 à 2014




Après la navigation de plaisance et les activités aquatiques, une entrée non intentionnelle dans l'eau (telle qu'une chute inattendue dans l'eau) durant une activité non reliée à l'eau étaient encore une fois les plus courantes (soit 20 %). Une moyenne de 91 personnes perd la vie à chaque année en raison d'une dégringolade non intentionnelle dans l'eau.

Les déplacements terrestres, sur la glace et aériens et comptent pour une moyenne de 14 % soit 64 décès reliés au domaine aquatique à chaque année ce qui représente la diminution la plus substantielle dans ce genre d'activité par rapport aux cinq années précédentes. De 2005 à 2009, une moyenne de 87 personnes est décédée par noyade à chaque année dans des incidents s'étant produits lors de déplacements (soit 18 %).

Tel qu'au cours de la période des cinq années antérieures, 9 % de tous les décès reliés à l'eau entre 2010 et 2014 se sont produit alors que la victime se trouvait dans sa baignoire. En moyenne 44 personnes se noient annuellement en prenant leur bain.

Type d'activité

Moyenne du nombre de décès par années et pourcentage de décès non-intentionnels reliés à l'eau au Canada de 2005 à 2014



Navigation de plaisance

Les bateaux à moteur sont souvent impliqués lors de décès liés à la plaisance. Les facteurs de risque les plus communs sont la consommation d'alcool et ne pas porter un vêtement de flottaison individuel.

Les caractéristiques des décès associés à la navigation de plaisance au Canada sont similaires à celles enregistrées dans le passé. Plus de la moitié (soit 53 %) des décès reliés à la plaisance ont encore une fois eu lieu lors de l'utilisation d'un bateau à moteur. Les petits bateaux à moteur de moins de 5,5 mètres de long ont davantage été impliqués dans de tels incidents (24 %) que les plus gros bateaux à moteur (12 %) et les motomarines (2 %). À chaque année, une moyenne de 64 noyades s'est produite lors de l'utilisation d'un bateau à moteur. Les canots (soit 22 %) constituent

le deuxième type d'embarcation (après les bateaux à moteur) le plus souvent impliqués lors d'incidents liés à la navigation de plaisance. Un total de 26 personnes se noie en moyenne à chaque année alors qu'elles faisaient du canot.

Parmi les incidents de décès reliés à la navigation de plaisance pour lesquels l'information au sujet des vêtements de flottaison individuels (VFI) était disponible, 82 % des victimes ne portaient pas de VFI/veste de sauvetage au moment de l'incident et un autre 4 % ne le portait pas correctement. Parmi les victimes qui ne portaient pas de VFI/veste de sauvetage au moins 34 % d'entre elles en avaient un à bord de l'embarcation, mais n'ont pas réussi à l'enfiler au moment de l'incident. La consommation d'alcool est un facteur lié à 39 % des décès associés à la navigation de plaisance. Le type le plus commun d'incidents relié à la plaisance résultant en une noyade étaient un chavirement (38 %) et tomber ou être projeté hors de l'embarcation (28 %).

Pourquoi les noyades se sont-elles produites? Les facteurs de risque...

Les principaux facteurs de risque des décès reliés à l'eau au Canada contribuant au « pourquoi » ils se sont produits reflètent ceux déjà identifiés par le passé.

La consommation d'alcool est un facteur couramment associée à la noyade. Au Canada, dans environ un incident de décès par noyade sur trois, la victime avait consommé de l'alcool avant l'incident. L'absence du port d'un vêtement de flottaison individuel ou d'une veste de sauvetage à bord d'une embarcation est également une circonstance habituelle. D'après nos statistiques seulement 1 victime sur 10 des personnes décédées par noyade portait un VFI au moment de l'incident. La consommation d'alcool ainsi que le fait de ne pas porter un VFI sont des facteurs de risque plus particulièrement chez les ados (de 15 à 19 ans) et les jeunes adultes (de 20 à 34 ans).

Vous trouverez à droite une liste abrégée des principaux facteurs de risque établis pour la période entre 2010 et 2014. Ces facteurs sont présentés d'après les activités les plus courantes (soit la natation et la plaisance) ainsi que par groupes d'âge.

Navigation de plaisance

- ➔ Absence du port de VFI/veste de sauvetage (82 % des décès reliés à la navigation de plaisance pour lesquels l'information au sujet des VFI était disponible)
- ➔ Eau froide (59 % des décès reliés à la navigation de plaisance pour lesquels l'information au sujet de la température de l'eau était disponible)
- ➔ Consommation d'alcool (39 %)
- ➔ Chavirement (38 %)
- ➔ Navigation non accompagné (29 %)
- ➔ Chute dans l'eau ou projection par-dessus bord (28 %)
- ➔ Plaisance dans l'obscurité ou à la tombée de la nuit (24 %)
- ➔ Eau agitée (21 %)

Natation

- ➔ Ne pas savoir nager du tout ou pas très bien (45 % des décès associés à la pratique de la natation pour lesquels l'information au sujet des habiletés en natation était disponible)
- ➔ Consommer de l'alcool (34 %)
- ➔ Nager seul (28 %)
- ➔ Être victime d'un malaise/accident cardiaque soudain pendant la pratique de la natation (20 %)

De 0 à 4 ans

- ➔ Être seul près de l'eau (61 %)
- ➔ Ne pas être supervisé (58 %)
- ➔ Être supervisé mais de manière distraite (36 %)
- ➔ Être uniquement en présence d'autres mineurs (22 %)

De 5 à 14 ans

- ➔ Ne pas porter de VFI lorsque requis (56 %)
- ➔ Être uniquement en présence d'autres mineurs (50 %)

De 15 à 19 ans

- ➔ Ne pas porter de VFI lorsque requis (96 % des décès pour lesquels l'information au sujet des VFI était disponible)
- ➔ Consommer de l'alcool (41 %)
- ➔ Ne pas être accompagné (26 %)
- ➔ Être dans l'eau, sur l'eau ou près de l'eau après la tombée de la nuit (21 %)

De 20 à 34 ans

- ➔ Ne pas porter de VFI lorsque requis (85 % des décès pour lesquels l'information au sujet des VFI était disponible)
- ➔ Consommer de l'alcool (51 %)
- ➔ Ne pas être accompagné (31 %)
- ➔ Être dans l'eau, sur l'eau ou près de l'eau après la tombée de la nuit (24 %)

De 35 à 64 ans

- ➔ Ne pas porter de VFI lorsque requis (77 % des décès pour lesquels l'information au sujet des VFI était disponible)
- ➔ Ne pas être accompagné (51 %)
- ➔ Consommer de l'alcool (44 %)

65 ans et plus

- ➔ Ne pas porter de VFI lorsque requis (78 % des décès pour lesquels l'information au sujet des VFI était disponible)
- ➔ Ne pas être accompagné (72 %)
- ➔ Consommer de l'alcool (21 %)



En bref

Selon les plus récentes données recueillies la tendance à la baisse du nombre de décès par noyade se poursuit au Canada. En 2014, le nombre de décès non intentionnels reliés à l'eau rapportés en provenance des bureaux de coroners en chef et des médecins légistes totalisait 428, le total le plus bas au cours des 25 ans dernières années.

C'est encore parmi les hommes, les jeunes adultes de 20 à 34 ans et les personnes âgées de plus de 65 ans que l'on déplore le plus grand nombre de noyades.

Les noyades sont plus susceptibles de se produire durant l'été et lors des fins de semaine et ce dans des plans d'eau naturels tels que les lacs et les rivières. Moins de noyades se déroulent dans des structures non naturelles, toutefois les piscines résidentielles et les baignoires représentent toujours les endroits où les décès par noyade ont lieu le plus souvent.

Malgré une diminution en comparaison avec les cinq années antérieures, un plus haut taux de noyades entre 2010 et 2014 a encore une fois été recensé dans les Territoires. La Saskatchewan est la seule province dans laquelle le taux d'incidents reliés à l'eau a augmenté.

Près du tiers de toutes les noyades non-intentionnelles se sont produites lors d'activités récréatives et un autre quart arrivent pendant des activités de vie quotidienne. Par type d'activité, la plaisance et les activités aquatiques telles que nager et patauger étaient les plus courantes.

Les progrès à long terme que nous avons réalisés dans le but de faire diminuer le nombre de noyades au Canada sont encourageants, mais il se produit encore annuellement près de 464 décès évitables et non intentionnels reliés à l'eau. Ce fait confirme pour nous le besoin de poursuivre nos efforts de prévention de la noyade.

Rapport sur la noyade au Canada

Méthodologie de recherche

Les données complètes de 1990 à 2014

Le processus de recherche sur la noyade repose sur une collecte de données, des tableaux de recherche et une analyse de ceux-ci. Les données sur la noyade proviennent des bureaux des coroners en chef et des médecins légistes de chaque province et territoire. L'ampleur de cette recherche comprend ce qui suit :

- La collecte des données requises afin d'établir le profil des victimes d'incidents reliés à l'eau, incluant les circonstances et les facteurs ayant contribué à ces incidents.
- Inclut l'ensemble de tous les décès déplorés dans chaque province et territoire ainsi que globalement au Canada résultant d'incidents ayant eu lieu « dans l'eau, sur l'eau ou près de l'eau ». Ces incidents sont inclus s'ils sont étroitement liés à des activités aquatiques récréatives, professionnelles ou de vie quotidienne ou si la présence de l'eau semble avoir été un attrait ayant contribué à l'incident.
- Inclut seulement les décès non-intentionnels. N'inclut pas ceux résultant de causes naturelles, les suicides ou les homicides.

Les données provisoires

Les données finales complètes sur les plus récentes noyades et autres décès liés au domaine aquatique en provenance de bureaux provinciaux et territoriaux des coroners en chef et des médecins légistes ne sont pas encore disponibles. Ces données provisoires et préliminaires proviennent par conséquent de communiqués de presse, d'extraits d'articles parus dans des journaux, de rapports de nouvelles et de recherches sur Internet.

Remerciements

Nous tenons à souligner notre gratitude pour l'appui, la collaboration et les efforts des personnes suivantes :

- Les bureaux des coroners en chef et des médecins légistes en chef de chaque province et territoire qui nous ont permis et ont favorisé l'accès aux rapports confidentiels sur les décès non intentionnels associés à l'eau. Ces données ont fournies la base pour ce qui est de la recherche et de l'élaboration de ce rapport.
- Nos bénévoles, qui ont consacré leur temps et leur énergie à effectuer les recherches, soit l'extraction de données sur les décès non intentionnels reliés au domaine aquatique à partir des rapports des coroners.
- Tessa Clemens qui a assumé les rôles d'auteure principale et d'analyste des données pour l'élaboration de ce rapport et Lucie Simoes, qui était responsable de la saisie et de la vérification de ces données.

Centre canadien de recherche sur la prévention de la noyade

Le Centre canadien de recherche sur la prévention de la noyade est la principale agence de recherche sur la noyade et les incidents liés à l'eau au Canada. Le Centre effectue de la recherche sur les noyades fatales et non fatales, les traumatismes aquatiques majeurs et les interventions de sauvetage.

Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez communiquer avec la Directrice de la recherche, Barbara Byers par courriel à : experts@drowningresearch.ca ou par téléphone au 416-490-8844.



Coordonnées pour nous joindre

Bureau national

Téléphone : 613.746.5694
Courriel : experts@sauvetage.ca
www.sauvetage.ca

Colombie-Britannique et Yukon

Téléphone : 604.299.5450
Courriel : info@lifesaving.bc.ca
www.lifesaving.bc.ca

Alberta et Territoires du Nord-Ouest

Téléphone : 780.415.1755
Courriel : experts@lifesaving.org
www.lifesaving.org

Saskatchewan

Téléphone : 306.780.9255
Courriel : lifesaving@sasktel.net
www.lifesavingsociety.sk.ca

Manitoba

Téléphone : 204.956.2124
Courriel : aquatics@lifesaving.mb.ca
www.lifesaving.mb.ca

Ontario

Téléphone : 416.490.8844
Courriel : experts@lifeguarding.com
www.lifesavingsociety.com

Québec

Téléphone : 514.252.3100 ou 1.800.265.3093
Courriel : alerte@sauvetage.qc.ca
www.sauvetage.qc.ca

Nouveau-Brunswick

Téléphone : 506.455.5762
Courriel : info@lifesavingnb.ca
www.sauvetagenb.ca

Nouvelle-Écosse

Téléphone : 902.425.5450
Courriel : experts@lifesavingsociety.ns.ca
www.lifesavingsociety.ns.ca

Île-du-Prince-Édouard

Téléphone : 902.368.7757
Courriel : info@lifesavingsocietypei.ca
www.lifesavingpei.ca

Terre-Neuve-et-Labrador

Téléphone : 709.576.1953
Courriel : info@lifesavingnl.ca
www.lifesavingnl.ca

La Société de sauvetage

La Société de sauvetage – l'expert en surveillance aquatique au Canada – se consacre à la prévention de la noyade et à faire diminuer les traumatismes associés à l'eau par le biais de ses programmes de formation, sa campagne d'éducation du public Aqua Bon^{MD}, ses services de gestion en sécurité aquatique, sa recherche sur la noyade et le sauvetage sportif. Plus de 1 000 000 de Canadiens participent annuellement aux cours de formation de la Société en natation, sauvetage, surveillance aquatique et leadership. La Société établit les normes pour ce qui est de la sécurité aquatique au Canada et elle décerne le certificat Sauveteur national à tous les surveillants-sauveteurs au Canada.



**WORLD CONFERENCE ON
DROWNING PREVENTION** VANCOUVER
17 - 19 OCTOBRE 2017

Échanger Globalement, Prévenir Localement

La Société de sauvetage Canada accueillera la Conférence mondiale sur la prévention de la noyade de l'International Life Saving Federation à Vancouver du 17 au 19 octobre prochains. Pour obtenir plus d'information à ce sujet vous pouvez visiter www.wcdp2017.org.



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE^{MD}
Les experts en surveillance aquatique