


Rapport sur LA NOYADE au Canada

Édition 2015

Préparé par le Centre canadien de recherche sur la prévention de la noyade pour la Société de sauvetage

Variation du nombre de décès évitables liés à l'eau et du taux de mortalité au Canada, 1993–2012



● Moyenne de décès par année
■ Taux de mortalité par année pour 100 000 habitants

Les dernières données font état de progrès évidents et considérables à long terme en matière de réduction du nombre de décès par noyade au Canada. En effet, depuis les 20 dernières années, le taux de décès liés à l'eau diminue de manière régulière, la moyenne annuelle passant de 2,1 pour 100 000 habitants au milieu des années 1990 (1993-1997) à 1,4 pour 100 000 habitants au cours de la plus récente période analysée (2008-2012).

Malgré cette diminution encourageante du taux de décès, le nombre de noyades au Canada demeure élevé. En effet, 495 décès liés à l'eau ont été recensés sur le territoire canadien en 2012, soit la dernière année pour laquelle des données complètes sont disponibles auprès des bureaux provinciaux/territoriaux des coroners en chef et médecins légistes en chef. Il s'agit du taux le plus élevé enregistré depuis 2006; cela confirme donc la nécessité de continuer de déployer d'importants efforts en matière de prévention de la noyade. Entre 2008 et 2012, 2 392 décès par noyade ont été déplorés, soit une moyenne annuelle de 478 noyades.

Les données concernant les noyades recensées depuis 2012 sont provisoires et préliminaires, puisqu'elles proviennent de rapports publiés dans les médias et sur Internet. Tel qu'indiqué dans le tableau à la page suivante, au moins 359 noyades ont été signalées en 2013, et au moins 308 autres en 2014.

Nombre de décès évitables liés à l'eau au Canada, 1990–2012



Nombre de décès évitables reliés à l'eau au Canada, 2013 et 2014

	2013	2014
Alberta	34	28
Colombie-Britannique	74	62
Manitoba	12	15
Nouveau-Brunswick	11	6
Terre-Neuve et Labrador	11	14
Territoires du Nord-Ouest	4	1
Nouvelle-Écosse	18	12
Nunavut	3	7
Ontario	113	86
Île-du-Prince-Édouard	3	1
Québec	57	52
Saskatchewan	17	22
Yukon	2	2
Total	359	308

Note : Les chiffres figurant dans ce tableau correspondent à des données provisoires préliminaires issues de rapports publiés dans les médias et sur Internet.

QUELLES SONT LES PERSONNES QUI SE NOIENT?

ÂGE


Entre 2008 et 2012, la moyenne d'âge des victimes de noyade s'établissait à 42,8 ans. Les taux de mortalité les plus élevés au cours de cette période ont été recensés chez les jeunes adultes âgés entre 20 et 34 ans et les personnes âgées de 65 ans et plus (1,7 pour 100 000 habitants pour les deux catégories). Ces taux sont similaires à ceux de la période précédente (2003-2007). Parmi ces catégories d'âge, les taux de mortalité les plus élevés ont été enregistrés chez les jeunes de 20 à 24 ans et les aînés de 80 à 84 ans (2 pour 100 000 habitants). De toutes les tranches d'âge, c'est chez les jeunes âgés de 20 à 24 ans que le plus grand nombre de décès par noyade ont été déplorés (228).

On enregistre également des taux élevés chez les baby-boomers âgés entre 50 et 64 ans (1,5 pour 100 000) et les adultes de 35 à 49 ans (1,4 pour 100 000). Il est toutefois encourageant de constater que ces deux taux ont légèrement diminué par rapport à ceux de la dernière période de cinq ans analysée (1,6 et 1,5 respectivement).

Les efforts d'éducation en matière de prévention de la noyade auprès des parents de jeunes enfants semblent porter leurs fruits. En effet, une tendance à long terme vers une baisse des taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans semble se confirmer. Cette tendance se poursuit de 2008 à 2012, période au cours de laquelle le taux de mortalité de cette catégorie d'âge s'établit à 1,1 (soit une diminution de 8 % par rapport au taux de 1,2 enregistré en 2003-2007).

Groupe d'âge

Nombre de décès évitables reliés à l'eau et taux de mortalité au Canada, 2008-2012



SEXE

La grande majorité des victimes de noyade continuent d'être des hommes. Parmi les 2 392 personnes qui se sont noyées entre 2008 et 2012, 1 968 (82 %) d'entre elles étaient des hommes. La prépondérance des victimes de sexe masculin est évidente dans tous les groupes d'âge, particulièrement chez les jeunes adultes de 20 à 34 ans. En effet, parmi cette catégorie d'âge, 9 victimes sur 10 sont des hommes. Néanmoins, en 2012, 106 victimes étaient de sexe féminin (21 %). Il s'agit de la plus forte proportion de victimes de sexe féminin constatée depuis les 10 dernières années.

ETHNIE

Les études antérieures semblent indiquer que les nouveaux arrivants au Canada sont plus susceptibles de se noyer que le reste de la population. En 2010, le Centre canadien de recherche sur la prévention de la noyade a commencé à recueillir des données portant sur le pays d'origine des victimes de noyade et le nombre d'années passées au Canada.

Malheureusement, dans 60 % des cas, le pays d'origine n'a pu être déterminé, et il a été encore plus difficile d'établir le nombre d'années passées au Canada. Dans les cas où cette information était disponible, 50 victimes de noyade (depuis 2010) proviendraient d'Afrique, d'Asie ou d'Europe. Des efforts supplémentaires doivent être déployés afin d'améliorer la collecte de ces renseignements.

Entre 2008 et 2012, 10 % (229) des victimes de noyade aurait été d'origine autochtone – une proportion bien plus élevée que les quelque 4 % de la population canadienne s'identifiant comme étant d'origine autochtone.

QUAND


LES NOYADES SE PRODUISENT-ELLES?

MOIS DE L'ANNÉE

Bien que les décès reliés à l'eau surviennent tout au long de l'année au Canada, ils ont principalement lieu lors des mois les plus chauds, particulièrement en été. Entre 2008 et 2012, la majorité des noyades (66 %) ont eu lieu entre mai et septembre, et ont atteint un record en juillet et en août (34 %). Ces données reflètent la tendance observée entre 2003 et 2007.

JOUR DE LA SEMAINE

Entre 2008 et 2012, plus de la moitié (54 %) des noyades ont eu lieu pendant la fin de semaine (de vendredi à dimanche), soit un taux légèrement plus élevé que celui enregistré entre 2003 et 2007 (50 %). De 2008 à 2012, la fréquence et la proportion de noyades ont diminué tous les jours de la semaine, sauf le jeudi.



OÙ

LES NOYADES ONT-ELLES LIEU?

PLAN D'EAU


Les plans d'eau naturels, tels que les lacs et les étangs (39 %), les rivières, criques et ruisseaux (27 %) et les océans (10 %) demeurent les lieux où surviennent la majorité (76 %) des noyades au Canada pour la période allant de 2008 à 2012. Ce pourcentage est encore plus élevé dans les Provinces maritimes, à Terre-Neuve-et-Labrador et les Territoires : dans ces régions, de 86 à 100 % des décès reliés à l'eau surviennent dans des plans d'eau naturels.

Les noyades en milieux non naturels sont toujours moins nombreuses, mais demeurent également une source de préoccupation, notamment pour les enfants et les aînés. Ce sont les baignoires qui constituent l'environnement non naturel où ont lieu le plus de noyades au Canada (9 %). On note une hausse du nombre de noyades dans les baignoires (+10 % entre 2008 et 2012 par rapport à la période précédente). Cette augmentation peut notamment être attribuée à la forte augmentation du nombre de noyades dans les baignoires en Ontario (+48 % durant la période précédente analysée).

Les enfants de moins d'un an sont particulièrement susceptibles de se noyer dans une baignoire. En effet, 75 % des noyades impliquant des enfants âgés de moins d'un an ont eu lieu dans une baignoire. Les jeunes enfants et les personnes âgées ne sont également pas à l'abri de tels incidents : 13 % des noyades chez les enfants de 1 à 4 ans, et 16 % des noyades chez les adultes de 65 ans et plus sont survenues dans une baignoire.

Les environnements aquatiques

Moyenne du nombre de décès par année et pourcentage de décès évitables reliés à l'eau au Canada, 2003–2012



Note : Les chiffres ont été arrondis et peuvent ne pas totaliser 100 %.

Conformément aux années précédentes, les noyades dans les piscines représentent 7 % des noyades survenues au Canada entre 2008 et 2012. La plupart des noyades dans les piscines ont eu lieu dans des piscines résidentielles (84 %). C'est dans les piscines que le plus grand nombre de noyades chez les enfants de moins de 5 ans continuent de se produire (41 %).

Les noyades dans des milieux supervisés par des surveillants-sauveteurs, comme les piscines publiques et les plages, sont toujours aussi rares; elles constituent moins de 2 % des décès reliés à l'eau pour la période allant de 2008 à 2012.

PROVINCES ET TERRITOIRES

Ce sont toujours les Territoires qui affichent les taux de noyade les plus élevés du Canada. En effet, entre 2008 et 2012, le taux annuel moyen pour les trois Territoires s'établit à 10,1 pour 100 000, soit un taux sept fois supérieur au taux de décès reliés à l'eau pour l'ensemble du Canada. Heureusement, ce taux a tendance à diminuer au fil du temps. Entre 2008 et 2012, le taux de noyade dans le nord du Canada a chuté de 29 % (il s'établissait à 14,2 pour 100 000 en 2003–2007).

Entre 2008 et 2012, le taux annuel moyen de décès reliés à l'eau a diminué de 51 % dans les Territoires du Nord-Ouest (de 15,8 à 7,8 pour 100 000), et de 25 % au Nunavut (de 15,2 à 11,4 pour 100 000).

Après les Territoires, Terre-Neuve-et-Labrador (4,2 pour 100 000), le Manitoba (2,3 pour 100 000), la Saskatchewan (2,1 pour 100 000) et la Colombie-Britannique (1,8 pour 100 000) sont les provinces qui affichent les taux de noyade les plus élevés.


La plus forte hausse des taux de noyade a été enregistrée en Saskatchewan (+40 % pour la période 2008 – 2012 par rapport à 2003 – 2007) et au Manitoba (+28 %). En revanche, les plus importantes baisses ont été recensées dans les Territoires, à l'Île-du-Prince-Édouard (-85 %), en Alberta (-25 %) et au Nouveau-Brunswick (-24 %).

MILIEUX URBAINS ET RURAUX

Le nombre de noyades en milieu rural est disproportionné par rapport au nombre de personnes habitant ce type de milieu. En effet, bien que moins de 20 % de la population canadienne vive en milieu rural, un peu plus de 40 % de toutes les noyades s'y sont produites. Près de la moitié (48 %) des victimes de noyade en milieu rural auraient résidé de manière permanente en milieu urbain. La Saskatchewan (81 %), le Manitoba (74 %) et les Territoires (71 %) affichent les plus fortes proportions de noyades en milieu rural au Canada.

Provinces et Territoires

Moyenne du nombre de décès évitables reliés à l'eau et du taux de mortalité au Canada, 2003–2012



Note : Le nombre de décès correspond à une moyenne par année, et le taux de mortalité correspond à la moyenne par année pour 100 000 habitants.

À QUELS

TYPES D'ACTIVITÉS


LES VICTIMES S'ADONNAIENT-ELLES?

BUT DE L'ACTIVITÉ

C'est encore lors d'activités récréatives qu'a lieu la majorité des noyades au Canada (62 %). Entre 2008 et 2012, 1 477 personnes ont été victimes de noyade alors qu'elles s'adonnaient à des activités récréatives dans l'eau, sur l'eau ou près de l'eau; cela correspond à une légère augmentation (+4 %) par rapport à la période allant de 2003 à 2007. Parmi ces noyades, 381 sont survenues lors de la pratique de la « natation », l'activité récréative la plus couramment pratiquée lors de noyades (26 %). La deuxième activité la plus populaire était « marcher, courir ou jouer près de l'eau ou sur la glace », et a coûté la vie à 245 personnes (17 %).


Au total, 25 % des victimes de noyade au Canada s'adonnaient à diverses activités de la vie quotidienne. Entre 2008 et 2012, 603 personnes vauquaient à une « activité de la vie quotidienne » juste avant de se noyer; cela représente une légère hausse (+3 %) par rapport à la période allant de 2003 à 2007. La majorité de ces victimes étaient en train de prendre un bain (34 %) ou ont été impliqués dans un accident de véhicule (33 %).

Les principales activités récréatives Moyenne du nombre de décès par année et pourcentage des décès évitables reliés à l'eau au Canada, 2008–2012



But de l'activité

Moyenne du nombre de décès par année et pourcentage de décès évitables reliés à l'eau au Canada, 2003–2012



Peu de noyades sont survenues pendant une activité professionnelle (5 %) au Canada; toutefois, les noyades liées aux activités professionnelles ont entraîné une grande proportion de décès reliés à l'eau à Terre-Neuve-et-Labrador (29 %) et en Nouvelle-Écosse (22 %). L'activité professionnelle la plus communément pratiquée avant la noyade était la pêche commerciale (38 %).

Dans 147 cas (6 %), l'activité pratiquée immédiatement avant la noyade est inconnue, ce qui indique que plusieurs victimes pratiquaient des activités aquatiques en étant seules, ou que personne ne peut témoigner au sujet de l'activité pratiquée par les victimes de noyade avant l'incident.


TYPE D'ACTIVITÉ

Une fois de plus, l'activité la plus communément pratiquée avant les décès reliés à l'eau était la navigation de plaisance (27 %, soit un taux semblable à celui enregistré entre 2003–2007). Entre 2008 et 2012, 634 personnes ont été victimes de noyade en pratiquant la navigation au Canada; cela représente en moyenne 127 victimes par an. Le deuxième type d'activité le plus fréquent (25 %) était de nature « aquatique », c'est-à-dire que la victime avant l'intention d'être dans l'eau au moment de l'incident.

Les chutes accidentelles dans l'eau lors d'activités autres qu'aquatiques ont entraîné la troisième plus grande proportion d'incidents (20 %), et c'est ce type d'activité qui a connu la plus forte augmentation de victimes (+13 % par rapport à la période allant de 2003 à 2007). Les noyades survenues dans des baignoires ont, quant à elles, résulté en une plus petite proportion des décès reliés à l'eau (9 %).


Type d'activité

Moyenne du nombre de décès par année et pourcentage de décès évitables reliés à l'eau au Canada, 2003–2012



Incidents en navigation de plaisance par genre d'embarcation

Moyenne du nombre de décès par année et pourcentage de décès liés à la navigation de plaisance au Canada, 2003–2012



INCIDENTS EN NAVIGATION DE PLAISANCE

Entre 2008 et 2012, le nombre de décès associés à la navigation de plaisance est semblable à celui enregistré au cours des périodes précédentes. Plus de la moitié (54 %) de ces décès ont eu lieu lors de l'utilisation d'un bateau à moteur. Les petits bateaux à moteur de moins de 5,5 mètres de long ont davantage été impliqués dans ces incidents (27 %) que les grands bateaux à moteur (13 %) et les motomarines (2 %). Les canots constituent le deuxième type d'embarcation le plus souvent présent lors d'incidents liés à la navigation de plaisance (21 %). Cette répartition des types d'embarcation est semblable à celle reportée lors de la période allant de 2003 à 2007.

Dans le cas des décès reliés à la navigation de plaisance pour lesquels l'information au sujet des vêtements de flottaison individuels (VFI) était disponible, 81 % des victimes ne portaient pas de VFI/gilet de sauvetage au moment de l'incident. Parmi les 446 victimes qui ne portaient pas de VFI/gilet de sauvetage, 152 (34 %) d'entre elles en avaient un à bord de l'embarcation, mais ne le portaient pas au moment de l'incident. La consommation d'alcool est un facteur lié à 40 % des décès associés à la navigation de plaisance.

POURQUOI

LES NOYADES SE SONT-ELLES PRODUITES? LES FACTEURS DE RISQUE...

Les principaux facteurs de risque de décès relié à l'eau au Canada reflètent ceux identifiés par la Société de sauvetage dans le passé. La consommation d'alcool a été un facteur courant associé à la noyade; au Canada, dans environ un cas de décès par noyade sur trois, les victimes avaient consommé de l'alcool avant l'incident.

Les principaux facteurs de risque associés aux activités courantes de navigation de plaisance et de natation ainsi qu'à chaque groupe d'âge sont identifiés ci-dessous, selon les données recueillies entre 2008 et 2012.

NAVIGATION DE PLAISANCE

- Absence de port de VFI/gilet de sauvetage (81 % des décès reliés à la navigation de plaisance pour lesquels l'information au sujet des VFI était disponible)
- Eau froide (53 % des décès reliés à la navigation de plaisance pour lesquels l'information au sujet de la température de l'eau était disponible)
- Consommation d'alcool (40 %)
- Chavirement (38 %)
- Navigation en étant non accompagné (27 %)
- Chute dans l'eau ou projection par-dessus bord (26 %)

NATATION

- Ne pas savoir nager ou ne pas bien savoir nager (43 % des décès associés à la pratique de la natation pour lesquels l'information au sujet des habiletés en natation était disponible)
- Consommer de l'alcool (31 %)
- Nager seul (25 %)
- Être victime d'une maladie/accident cardiaque soudain pendant la pratique de la natation (19 %)

DE 0 À 4 ANS

- Être seul près de l'eau (58 %)
- Ne pas être supervisé (49 %)
- Être supervisé de manière distraite (43 %)
- Être en présence d'autres mineurs uniquement (23 %)

DE 5 À 14 ANS

- Être en présence d'autres mineurs uniquement (35 %)

DE 15 À 19 ANS

- Ne pas porter de VFI lorsque nécessaire (90 % des décès pour lesquels l'information au sujet des VFI était disponible)
- Consommer de l'alcool (41 %)
- Être non accompagné (27 %)
- Être dans l'eau, sur l'eau ou près de l'eau la nuit tombée (23 %)

DE 20 À 34 ANS

- Ne pas porter de VFI lorsque nécessaire (86 % des décès pour lesquels l'information au sujet des VFI était disponible)
- Consommer de l'alcool (51 %)
- Être non accompagné (29 %)
- Être dans l'eau, sur l'eau ou près de l'eau la nuit tombée (28 %)

DE 35 À 64 ANS

- Ne pas porter de VFI lorsque nécessaire (76 % des décès pour lesquels l'information au sujet des VFI était disponible)
- Être non accompagné (49 %)
- Consommer de l'alcool (42 %)

65 ANS ET PLUS

- Ne pas porter de VFI lorsque nécessaire (80 % des décès pour lesquels l'information au sujet des VFI était disponible)
- Être non accompagné (69 %)
- Consommer de l'alcool (21 %)

EN BREF

Selon les dernières données, une tendance à la baisse du nombre de décès par noyade semble se confirmer au Canada. Toutefois, on dénombre toujours près de 500 décès reliés à l'eau chaque année, et on a déploré en 2012 le plus grand nombre de noyades depuis 2006.

C'est parmi les hommes, les jeunes adultes de 20 à 34 ans et les personnes âgées de plus de 65 ans que l'on déplore le plus grand nombre de noyades.

Les noyades sont plus susceptibles de se produire pendant l'été et les fins de semaine, et dans les plans d'eau naturels tels que les lacs et les rivières. Il y a moins de noyades dans les piscines résidentielles, mais celles-ci représentent un risque particulier pour les enfants de moins de cinq ans.

Le plus grand nombre de noyades ont été recensées dans les provinces les plus densément peuplées, comme la Colombie-Britannique, l'Ontario et le Québec. Lorsqu'on ne prend pas en compte la densité de la population, c'est dans les Territoires, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Manitoba et en Saskatchewan que l'on dénombre le plus grand nombre de noyades.

Lorsqu'on analyse les activités pratiquées, on constate que la majorité des victimes s'adonnaient à des activités récréatives et nageaient, marchaient, couraient ou jouaient près de l'eau ou sur la glace.

La majorité des victimes de décès reliés l'eau s'adonnaient à des activités de navigation de plaisance. L'absence du port de VFI ou de gilet de sauvetage et la consommation d'alcool ont souvent été des facteurs contribuant aux incidents en navigation de plaisance.

Les progrès réalisés à long terme pour réduire le nombre de noyades au Canada semblent indiquer que les efforts de prévention portent leurs fruits. Toutefois, l'augmentation du nombre de décès par noyade en 2012 confirme le besoin de continuer sur cette lancée.

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

LES DONNÉES COMPLÈTES DE 1995 À 2012

Le processus de recherche sur la noyade repose sur la collecte de données, des tableaux de recherche et l'analyse. Les données sur la noyade proviennent des bureaux des coroners en chef et des médecins légistes de chaque province et territoire. La recherche porte sur :

- la collecte des données requises afin d'établir le profil des victimes d'incidents reliés à l'eau, incluant les circonstances et les facteurs ayant contribué à ces incidents;
- l'ensemble des décès déclarés dans chaque province/territoire et partout au Canada, et résultant d'incidents ayant eu lieu « dans l'eau, sur l'eau ou près de l'eau ». Sont également inclus les incidents étroitement liés à des activités aquatiques récréatives, professionnelles ou de la vie quotidienne, ainsi que les incidents causés par une présence d'eau qui a probablement attiré la victime;
- les décès évitables (non intentionnels), et non les décès dus à des causes naturelles, les suicides et les homicides.

LES DONNÉES PROVISOIRES

Les données définitives sur les noyades et autres décès reliés à l'eau survenus après 2012 en provenance des bureaux provinciaux et territoriaux des coroners en chef et des médecins légistes ne sont pas encore disponibles. Les données provisoires sont issues de communiqués de presse, d'articles de journaux, de rapports de nouvelles et de recherches sur Internet.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à souligner l'appui, la collaboration et les efforts des personnes suivantes :

- Les bureaux des coroners en chef et des médecins légistes dans chaque province et territoire, qui nous ont permis d'avoir accès aux rapports confidentiels des coroners sur les décès évitables reliés à l'eau. Ces données nous ont été utiles pour nos recherches et l'élaboration du présent rapport.
- Nos bénévoles, qui ont investi temps et énergie à effectuer les recherches, dont l'extraction de données, sur les décès évitables reliés à l'eau à partir des dossiers des coroners et des médecins légistes.
- Tessa Clemens, auteure principale et analyste de données de ce rapport, ainsi que Lucie Simoes, qui a assuré l'entrée et la vérification des données.

SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

La Société de sauvetage – l'expert en surveillance aquatique au Canada – est vouée à la prévention de la noyade et des traumatismes associés à l'eau par le biais de ses programmes de formation, sa campagne d'éducation du public Aqua Bon[®], ses services de gestion en sécurité aquatique, la recherche sur la noyade et le sauvetage sportif. Plus d'un million de Canadiens participent annuellement aux formations de la Société en natation, sauvetage, surveillance aquatique et leadership. La Société établit les normes pour la sécurité aquatique au Canada et certifie tous les surveillants-sauveteurs au Canada.



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE
Les experts en surveillance aquatique

NOUS REJOINDRE

Bureau national

Tél. : 613 746-5694
Courriel : experts@lifesaving.ca
www.lifesaving.ca

C.-B. et Yukon

Tél. : 604 299-5450
Courriel : info@lifesaving.bc.ca
www.lifesaving.bc.ca

Alberta et Territoires du Nord-Ouest

Tél. : 780 415-1755
Courriel : experts@lifesaving.org
www.lifesaving.org

Saskatchewan

Tél. : 306 780-9255
Courriel : lifesaving@sasktel.net
www.lifesavingsociety.sk.ca

Manitoba

Tél. : 204 956-2124
Courriel : aquatics@lifesaving.mb.ca
www.lifesaving.mb.ca

Ontario

Tél. : 416 490-8844
Courriel : experts@lifeguarding.com
www.lifesavingsociety.com

Québec

Tél. : 514 252-3100
Courriel : alerte@sauvetage.qc.ca
www.societedesauvetage.org

Nouveau-Brunswick

Tél. : 506 455-5762
Courriel : info@lifesavingnb.ca
www.lifesavingnb.ca

Nouvelle-Écosse

Tél. : 902 425-5450
Courriel : experts@lifesavingsociety.ns.ca
www.lifesavingsociety.ns.ca

Île-du-Prince-Édouard

Tél. : 902 368-7757
Courriel : info@lifesavingsocietypei.ca
www.lifesavingsocietypei.ca

Terre-Neuve-et-Labrador

Tél. : 709 576-1953
Courriel : lifeguard@bellaliant.com
www.lifesavingnl.ca

Centre canadien de recherche sur la prévention de la noyade

Le Centre canadien de recherche sur la prévention de la noyade est la principale agence de recherche sur la noyade et les incidents reliés à l'eau au Canada. Il mène des recherches sur les noyades mortelles et non mortelles, les traumatismes aquatiques majeurs et les interventions de sauvetage. Communiquez avec Barbara Byers, directrice de la recherche, à l'adresse experts@drowningresearch.ca ou au 416 490-8844.